t

er. 52 N°. 29

# Observations sur une picqueure au poulce de La main droyte.

Dans le mois de novembre dernier 1733 Je fus appellé
pour voir un rotisseur. quy setoit picqué auec sa lardoyre
a la Ionction de la premiere phalange du poulce auec la
seconde partie internne de la main droitte,

Il fit peu datantion a cest accident, et quelques Iours.
apres, en badinant auec un de ces Camarades il sentit
une vive douleur, a cette partie, Il y suruint, gonflement,
tention, ce quy lobligea, a mander un chirurgien, auparavant
moy, quy fit une incision sur larticulation de la derniere.
phalange du poulce, partie internne, dun demy travers.
de doigt de longueur, quil tamponna pandant quinse
Iours, Je my trasportté pour lors, et Je trouuay, Le
bras extremement gonflé, depuis lestremites des doyts,
Iusques a la partie moyenne superieure du bras, auec
tantion, fieure, doulleurs insuportable, ne pouuant faire
aucun mouuement de son bras. le tout recouuert dun
catasplasmes, dherbes emolientes et derbes. aromatiques.
un pareil etat mindiqua a remedier aux accidens quy
accompagnent un si grand angorgement

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

ARC 42 n° 35

et apres metre fait instruire, sy on avoit satisfait le
premier chirurgien, a quoy il faut toujours avoir soyn
avant que de prandre possetion, du malade et quon ma
ssura quil etoit content, jagis pour lors et pour cest
effet, je seigné le malade trois foys en vingt et quatre
heures. je fis appliquer des cataplasmes anodins, sur le
bras et lavant bras et un simple emplatre donguent
de la mer sur louverture du poulce
Le troysieme jour les accidens diminuerent un peu, on
mit en usage le cataplasmes resolutif, je reconeus, troys
jours apres une tumeur, assés circonscritte a la partie
moyenne interne et inferieure de lavant bras avec une
leger fluctuation, quy me fist connetre que la matiere
sejournoit dans cest androit, mais que son siege etoit
profont, le maturatif acheverent louvrage
jouvris la tumeur dans toute sa longueur, et pansay
la playe simplement et a secq, le huitieme jour de
loperation, le gomflement de tout lavant bras
cest dissipé et se borna sur toute la p. surface

De la partie externe dela main cest adire depuis
Larticulation du poygnent dusques alarticulation des os du
metacarpe quy sarticulent avec les premieres phalanges.
des doigts

Je fis appliqué sur cette partie. des resolutifs apres quils
eurent presque dissipé le gonflement, la playe du pouce
randoit une, matiere sanieuse cequy mobligea douvrir
dusques alarticulation dela premiere phalange du pouce
quy sarticule alos du metacarpe quy soutient le pouce

Malgre cette precaution le gonflement du dos dela main
revint comme la premiere foys, on fit des fomentations.
frequentes deau de vie camphrée et de sel almoniacq, dans
cette intervalle le malade se plegnit dunne douleur tres
vive au coude, Il y avoit inflamation, on mit en usage
La decoction de plantes anodinnes et resolutives, animée
dun peu deau de vie des seignées reyterées quy nonobstant
toutes ces precautions, le mal augmenta et revint presque
au meme point ou je lavois trouvé la premiere foys que
je fus mandé

Je me servis pour lors de memes topiques que javois fait

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

cy devant et la tumeur vingt en etat detre ouverte ce
que je fis selon lart depuis los lecranne jusques a
la partie moyenne inferieure et externe de lavant Bras
et pansay la playe Comme la premiere,

Cette derniere playe etant parvenüe pour ainsy dire —
aupoynt detre guerie Il survint un gonflement au pouce
jy fis applique un cataplasme avec le quatre farinnes et
le lait,

Quelques jours apres il se fit une legere ouverture a un
demy travers de doigts de distance dela premiere playe du
poulce delaquelle sortoit une matiere asses loüable

Je portay ma sonde dans louverture et la Conduisis a
un demy travers de doigt de distance du ligament annulaire
du poygnent partie interne ce quy intimida le malade
par la craynte quil ne fallut encore louvrir, ce que
je ne fis cepandant pas et je me proposé de me servir —
dinjection detercives trois fois par jour et dunne
compresse apliquée tout le long du sineux soutenue,
du Bandage expulcif pour tarir, la source de la

Superation abondante de ce sineus, ce quy arriua quinze
jours aprés, et le malade, guerit parfaitement dans
lespace de deux moys et demy ou enuiron —

Reflection

On peut atribüe la cause de ces differents depots a la
picqueure des parties tandineuses au raport que ces memes.
parties tandineuses ont les unes auec les autres suiuant
leur diferant points mobilles quelles ont, et au tamponage
mal auisé dans louuerture que fit le premier chirurgien
Ce quy est comfirmé par la pratique, ou dans quelques —
especes de panaris, on voit le desordres poussés plus loing
suiuant la situation de la matiere, et les parties interessées —

Taillard segond

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE